

## К распространению некоторых птиц Дальнего Востока

С.М.Смиренский, Р.Л.Бёме

Второе издание. Первая публикация в 1974\*

В 1970-1972 годах в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях собран материал, позволяющий дополнить имеющиеся данные о распространении ряда видов птиц.

*Phalacrocorax carbo*. Одиночный большой баклан встречен 26 августа 1971 в устье реки Томь, а 30 августа добыт охотником на реке Зея в 3 км выше села Натальино.

*Egretta alba*. Большая белая цапля встречена на реке Зея в 1.5 км выше Натальино.

*Grus monacha*. Чёрный журавль встречен 21 июля 1970 в окрестностях села Климауцы Свободненского района, а 28 августа 1971 и 6 сентября 1971 – на Зее выше Натальино.

*Parus major*. Большая синица гнездится в окрестностях села Климауцы. Со второй половины июля выводки кочуют вместе с пятнистыми коньками *Anthus hodgsoni*, поползнями *Sitta europaea* и пеночками. Зимующие птицы добыты в январе 1972 года. В Хинганском заповеднике эта форма впервые появилась в садах села Кундур 23 сентября 1972, но в лесах не была отмечена ни разу.

*Parus minor*. Белобрюхая большая синица встречена в конце мая около села Климауцы. Позже не наблюдалась. В конце августа – начале сентября эта форма обычна в окрестностях Натальино. Встречались и выводки. У слётков в течение 2-3 недель после вылета из гнезда сохраняется желтоватый оттенок груди и брюшка. В Хинганском заповеднике белобрюхая синица обычна на гнездовье. В это время встречается в лесу и в посёлке. В конце сентября 1972 года была обычна в лесу, но не обнаружена в посёлке. Обычной эта форма была в Большехецирском заповеднике и в «Кедровой пади». В 1972 году у многих пар отмечены вторые кладки. Наиболее поздний вылет молодых из гнезда наблюдался в «Кедровой пади» 13 августа 1972.

*Zoothera sibirica*. Поющий самец сибирского дрозда наблюдался в Хинганском заповеднике в верховьях реки Мутной. Птица держалась на склоне сопки в смешанном лесу с густым подлеском.

*Phylloscopus tenellipes*. Поющий самец бледноногой пеночки встре-

---

\* Смиренский С.М., Бёме Р.Л. 1974. К распространению некоторых птиц Дальнего Востока // Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф. М., 1: 234-236.

чен 2 июня 1972 в пойменном лесу около села Кундур в Хинганском заповеднике.

*Bradypterus tacsanowskius*. Пестрогрудка Тачановского (несколько поющих самцов) отмечена около села Климауцы в июне-июле 1970 года в кустарниках по берегу пересохшего русла ручья.

*Motacilla alba leucopsis* Gould, 1838. Белая трясогузка немногочисленна в окрестностях села Климауцы.

*Dendronanthus indicus*. Две гнездящиеся пары древесной трясогузки встречены в черноберезнике паркового типа около села Климауцы. У самки, добытой там 18 июня 1970, имелось большое наседное пятно. Поющий самец встречен у села Кундур в дубраве на склоне сопки 4 июня 1972.

*Sturnus cineraceus*. Небольшая колония серого скворца найдена в окрестностях села Климауцы 18 июня 1970. В этот день наблюдался вылет молодых. Выводки держались вблизи колонии на сырых лугах до 3 июля. Одиночная птица встречена 1 августа 1971. В Хинганском заповеднике серый скворец в большом числе населяет дубравы равнинной части.

*Zosterops erythropleura*. Стайки молодых и взрослых белоглазок встречены в ивняках поймы Зеи у села Натальино 25 и 26 августа и 5 сентября 1971. Обычна в смешанных лесах по вершинам сопкок в Хинганском заповеднике. В Больш-Хехцирском заповеднике 27 мая 1972 наблюдалась пара белоглазок, строящая гнездо. В «Кедровой пади», на центральной усадьбе, 28 июня 1972 найдено гнездо, помещавшееся в кроне невысокой ольхи в 4 м над землёй. В нём было 6 птенцов, вылетевших в этот же день. Взрослые птицы очень тревожились, но держались скрытно, перелетая с ветки на ветку и часто надолго замирая. Лишь изредка издавалась тревожная трель. Ведущие себя так же птицы наблюдались в низовьях Кедровой неоднократно.

*Emberiza elegans*. Обычная птица Хинганского заповедника.

*Eophona migratoria*. Поющие самцы малого черноголового дубоноса встречены в смешанной тайге по северным склонам сопкок Хинганского заповедника 10 июня 1972.

